



De citreoborstkanarie (*Serinus citrinipectus*) zal uit onze volières verdwijnen tenzij er meerdere genetische stammen worden opgebouwd. De afgebeelde vogel is een man.



De pop van de citreoborstcini heeft een valere borst- en flankkleur. Met deze vogel werd reeds gekweekt in Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en in België.

# AFRIKAANSE KANARIES

## Deel 1

*Een geïllustreerd  
overzicht van de  
Serinussen die in  
Europa gekweekt  
worden*

Alle foto's:  
© Cyril Laubscher



De witbuikcini (*S. dorsostrigatus*) uit Noord-Tanganyika heeft nood aan een zorgvuldige en weloverwogen kweekprogramma om in onze volières te kunnen overleven.



De man van de ondersoort *S. canicollis thompsonae* heeft een sterkere geelgroene kleur vanaf het voorhoofd tot aan de stuit. Deze ondersoort wordt teruggevonden in Botswana, het noordwesten en in het centrale gedeelte van Zuid-Afrika.



Geelstuitedelzanger man, hier de nominaat ondersoort *Serinus a. atrogularis*, toont zijn gele stuit bij het landen.



Mozambiekcini, hier de ondersoort *S. m. barbatus* bij het landen. De blekere staartranden zijn hier heel duidelijk zichtbaar.



Edelzanger, ondersoort (*S. l. pallens*) toont zijn witte stuit en flanken.



Kaapse kanarieman (*Serinus c. canicollis*) bij het eten van kleine panicumzaden.



Edelzanger, ondersoort *S. leucopygius pallens*, een populaire volière- én zangvogel.



De ondersoort *Serinus leucopygius riggenbachi* is donkerder dan de ondersoort *S. l. pallens*, en leeft wijdverspreid van Senegal tot Soedan.



Een Kaapse kanarieman in een prachtige conditie. Deze populaire zangvogel uit de Kaap wordt vaak in tuinen en parken waargenomen.